

# **Măsurarea răspândirii și pattern-ele consumului de droguri neinjectabile în Republica Moldova**

IMSP SCBI "Toma Ciorbă"  
Unitatea de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS

# Obiectivele studiului

- Amploarea, tipurile, frecvența și modelul consumului de droguri
- Profilul consumatorului de droguri neinjectabile
- Accesibilitatea și utilizarea serviciilor pentru tratamentul dependenței de droguri
- Prevalența HIV, a hepatitei B (HVB), hepatitei C (HVC) și a sifilisului.
- Esimarea dimensiunii populației


# Context și metode

- IBBS 2022 și exercițiul de estimare a dimensiunii grupului PCD au fost realizate în premieră la nivel național.
- **Grup țintă** – PCD – persoanele cu vârsta de 16 ani și mai mult, care au utilizat oricare din substanțele psihoactive ilicite pe parcursul ultimei luni.
- **Eșantion** – 1000 PCD, 4 site-uri de studiu, inclusiv 2 site-uri pe malul stâng al râului Nistru.
- **Screening** – teste pe urină pentru depistarea prezenței drogurilor în organismul persoanei, anterior intrării în studiu.
- **Staff-ul** implicat în colectarea de date, a fost femei/bărbați, inclusiv membri ai comunității PCD.


# Context și metode

- Metoda eșantionării ghidate de respondent, bazată pe probabilitate, prin referire de la egal-la-egal (EGR), utilizată pentru colectarea datelor de la populațiile ascunse interconectate prin rețele.
- EGR reduce limitările asociate metodelor de referire în rețeaua de cunoștințe prin ajustări statistice, ținându-se cont de dimensiunea și omogenitatea rețelei sociale.
- Eșantionarea începe cu subiecți selectați intenționat - *semințe*; componența eșantionului final este independentă de caracteristicile respondenților primari. Procesul de recrutare progresează producând numeroase valuri de recruți și se finalizează odată ce este atinsă dimensiunea calculată a eșantionului.


# Lanțurile de recrutare pentru fiecare site: Chișinău (a), Bălți (b), Tiraspol (c) și Râbnia (d)




# Lanțurile de recrutare, dezagregare după statutul HIV în site-ul Chișinău



# Profil socio-demografic, sexul




# Profil socio-demografic, grupuri de vârstă







# Droguri găsite în analizele de urină în toate locațiile (%), Republica Moldova, 2022




# Drogurile utilizate cel mai des în ultima lună, IBBS 2022



# Rezultate biologice, IBBS 2022, Republica Moldova



# Rezultate biologice în funcție de sex, IBBS 2022, Republica Moldova




# Asocieri semnificative ( $p < .05$ ) cu HIV

PCD cu HIV sunt semnificativ mai probabil să:

- fie din Bălți (1,9) (ref. Chișinău)
- fie femei (ref. Bărbați)
- fie  $\geq 25$  ani
- să aibă mai puțină educație
- să aibă  $\geq 2$  parteneri sexuali
- nu folosească prezervativul la ultimul contact sexual
- aibă contacte sexuale sub influența drogurilor
- Să aibă un partener ocazional consumator de droguri
- Să fi injectat cândva droguri
- Să fi fost cândva privat de libertate
- Să aibă HCV
- Să aibă Syphilis


# PCD Chisinau, 2022 (pop adulta: 424 105)



# Estimarea dimensiunii populației PCD, Republica Moldova, 2022

Site	Populație adultă	Număr estimat de PCD	% din populația adultă
Chisinau	424105	12723	3%
Balti	58995	3540	6%
Tiraspol	76800	2304	3%
Ribnita	28800	1728	6%

# Cartografierea amplorii consumului de droguri, raioane, Republica Moldova





- PCD au rețele sociale puternice - utilizarea modalităților de-la-egal-la-egal în programele de prevenire și altor intervenții.
- Pentru femei: modalități creative de tratament pentru a adresa necesitățile femeilor consumatoare de droguri. Studii calitative adiționale în rândul femeilor utilizatoare de droguri, pentru o mai bună înțelegere a comportamentelor și necesităților lor de tratament și de reducere a riscurilor.
- fortificarea programelor și eforturi adiționale pentru tineri axate pe promovarea unui mod sănătos de viață și acordarea de suport persoanelor tinere potential vulnerabile în raport cu consumul de droguri. sporirea accesului la serviciile outreach și de reducere a riscurilor în rândul tinerilor.
- Prevalența HIV ridicată în rândul PCD, în special în rândul femeilor, și trebuie abordată imediat prin activități de programe corespunzătoare de educare, testare, tratament și îngrijire.
- Sunt necesare studii ulterioare similare, cu utilizarea aceluiași criterii de eligibilitate și metodei de eșantionare.

Mulumesc pentru atenție!